


## Pasientkort

- Ha alltid pasientkortet med deg og vis det til helsepersonell du konsulterer (for eksempel hvis din behandlende lege er utilgjengelig eller du er på reise).
- Pasientkortet minner deg om de viktigste symptomene som må rapporteres umiddelbart til legen/sykepleieren. Det inneholder også kontaktinformasjon til din behandlende lege og vil gjøre annet helsepersonell oppmerksomme på at du blir behandlet med YERVOY®.
- Helsepersonell som behandler deg med YERVOY® skal fylle ut «Kontaktinformasjon til min lege» i pasientkortet og også fylle inn «Behandlende leges kontaktinformasjon» under.



### Behandlende leges kontaktinformasjon (den som forskrev YERVOY®)

Legens navn: .....

Telefonnummer i arbeidstiden: .....

Telefonnummer utenfor arbeidstiden: .....

Versjon 6, november 2020



For mer informasjon, se pakningsvedlegget for YERVOY® på [www.felleskatalogen.no](http://www.felleskatalogen.no) eller kontakt Bristol Myers Squibb medisinsk informasjon på telefon 23 12 06 37

Opdivo® and Yervoy® and the related logos are trademarks of Bristol Myers Squibb Company.  
©2020 Bristol Myers Squibb Company. All rights reserved.



[www.bms.com/no](http://www.bms.com/no)

Vurdert av Legemiddelverket: november 2020  
Lokalt godkjeningsnummer: ONC-NO-2300016

Versjon 6, november 2020

# YERVOY® (ipilimumab)

## Pasientinformasjonsbrosjyre

Hvis du har fått foreskrevet YERVOY® alene  
→ Se denne brosjyren og pasientkortet for YERVOY® (ipilimumab).

Hvis du har fått foreskrevet YERVOY® i kombinasjon med OPDIVO®  
→ Se i pasientkortet for OPDIVO® (nivolumab).



[www.bms.com/no](http://www.bms.com/no)

Vurdert av Legemiddelverket: november 2020  
Lokalt godkjeningsnummer: ONC-NO-2300016

Versjon 6, november 2020. ONC-NO-2300016

## Introduksjon

- Denne pasientbrosjyren gir deg informasjon om behandlingen med YERVOY® og beskriver tegn og symptomer på bivirkninger du kan få.
- Den gir også viktig informasjon om hva du skal gjøre dersom du får tegn eller symptomer, for å hindre at disse tegnene eller symptomene forverres og for at du skal bli behandlet så raskt og effektivt som mulig.
- YERVOY® kan gi alvorlige bivirkninger i ulike deler av kroppen, og disse må behandles umiddelbart, uavhengig av alvorlighetsgrad, for å unngå at de forverres.
- **Denne brosjyren inkluderer et pasientkort.** Ha alltid med deg pasientkortet og vis dette til alt helsepersonell du er i kontakt med (for eksempel hvis din behandlende lege er utilgjengelig eller du er på reise).
- Ytterligere informasjon om YERVOY® finnes i pakningsvedlegget.

## Hva du må sjekke med legen før behandling



**Før behandlingen starter må du informere legen din om enhver tidligere behandling du har fått og alle tidligere medisinske tilstander du har eller har hatt.**

### Før behandlingen starter vil legen i tillegg undersøke:

- om du tar kortikosteroider eller annen behandling som påvirker immunsystemet
- om du tar legemidler som hindrer blodpropp (antikoagulantia)
- leverfunksjonsprøver
- tyreoidafunksjonsprøver
- om du har en autoimmun sykdom (en tilstand der kroppen angriper sine egne celler)
- om du har eller har hatt en kronisk virusinfeksjon i leveren, inkludert:
  - hepatitt B (HBV)
  - hepatitt C (HCV)
- om du har humant immunsviktvirusinfeksjon (HIV) eller ervervet immunsvikt-syndrom (AIDS)
- om du er gravid, ammer eller planlegger å bli gravid
- din allmentilstand for å avgjøre om du er egnet for behandling

## De viktigste bivirkningene av behandlingen din

YERVOY® aktiverer immunsystemet ditt til å bekjempe kreftceller. Det er en risiko for at det aktiverte immunsystemet kan skade friske celler i kroppen din, noe som kan føre til potensielt alvorlige eller livstruende bivirkninger. Tegn og symptomer på bivirkninger kan oppstå når som helst under behandlingen eller måneder etter at behandlingen er avsluttet.

### Dersom du mistenker en bivirkning:

- Ring legen din **umiddelbart** dersom du opplever noen tegn eller symptomer, eller dersom disse vedvarer eller forverres. Milde tegn og symptomer kan raskt forverres dersom de ikke behandles.
- **IKKE** forsøk å behandle tegn eller symptomer på egenhånd.
- **IKKE** føl deg flau eller vær redd for at du plager legen.

### Vær oppmerksom på at:

- Følgende tegn og symptomer **IKKE** er de eneste tegnene og symptomene på bivirkninger fra behandling med YERVOY®.
- Noen tegn og/eller symptomer kan oppstå i en del av kroppen din som følge av en bivirkning i en annen del av kroppen (f.eks. kan guldfarget hud være et symptom på leverskade).

**Tidlig behandling av bivirkninger reduserer sannsynligheten for at YERVOY®-behandlingen må stoppes midlertidig eller permanent, slik at du får maksimalt utbytte av behandlingen.**

## Mulige Bivirkninger



### MAGE OG TARM

- diaré (vandig, løs eller bløt avføring), blod i avføringen eller mørkere avføring
- økning i antall avføringer
- smerte eller ømhet i magen eller mageregionen, kvalme, oppkast



### LEVER

- guldfarging av øyne eller hud (gulsott)
- smerter på høyre side av mageregionen
- mørk urin



### HUD

- hudutslett med eller uten kløe, tørr hud
- blemmer og/eller hudavskalling, munnsår
- hovent ansikt eller hovne lymfeknuter



### ØYE

- rødhet i øyet
- øyesmerter
- synsforandringer eller tåkesyn



### NERVER

- muskelsvakhet
- nummenhet eller kribling i bein, armer eller ansikt
- svimmelhet, tap av bevissthet eller problemer med å våkne



### GENERELLE

- feber, hodepine, tretthet
- blødninger
- endret oppførsel (f.eks. redusert sexlyst, irritabilitet eller glemsomhet)
- dehydrering, lavt blodtrykk, sjokk

## Andre viktige bivirkninger

### Alvorlige infusjonsreaksjoner

- Reaksjoner på infusjon av YERVOY® i blodomløpet kan oppstå, normalt i løpet av eller innen 24 timer etter mottatt dose.
- **Snakk med lege eller sykepleier med det samme dersom du får noen av disse symptomene under infusjon med YERVOY®: Frysninger eller skjelving, kløe eller utslett, rødme, vanskeligheter med å puste, svimmelhet, feber eller følelse av å besvime.**