

Ważna informacja o bezpieczeństwie leku zatwierdzona przez  
Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów  
Medycznych i Produktów Biobójczych

REBLOZYL® (Iuspatercept) Karta dla Pacjenta

# REBLOZYL® (Iuspatercept)

---

## Karta dla Pacjenta

(dla kobiet mogących zajść w ciążę)

# Informacja dla Pacjenta

**REBLOZYL (Iuspatercept) nie może być stosowany u kobiet w ciąży i przez 3 miesiące przed zajściem w ciążę. REBLOZYL może powodować wady u nienarodzonego dziecka.**

Produktu leczniczego REBLOZYL nie należy stosować w trakcie ciąży i karmienia piersią oraz u kobiet, które mogą zajść w ciążę i nie stosują, co najmniej jednej skutecznej metody antykoncepcji.

## • **Przed rozpoczęciem stosowania leku REBLOZYL:**

1. Lekarz zweryfikuje czy test ciążowy jest negatywny.
  2. Lekarz poinformuje o konieczności stosowania, co najmniej jednej skutecznej metody antykoncepcji w trakcie leczenia lekiem Reblozyl i przez 3 miesiące po zaprzestaniu leczenia tym lekiem.
- Testy ciążowe muszą być wykonywane w odpowiednich odstępach czasu.
  - W przypadku stwierdzenia ciąży lub podejrzenia ciąży w trakcie stosowania leku REBLOZYL lub w okresie 3 miesięcy od zaprzestania stosowania leku REBLOZYL należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza prowadzącego.

Na końcu karty znajdują się dane kontaktowe do lekarza prowadzącego.

## **Zgłaszanie działań niepożądanych**

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Wszelkie przypadki podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego związanego ze stosowaniem produktu leczniczego REBLOZYL prosimy zgłaszać do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, korzystając z następujących danych kontaktowych:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań  
Produktów Leczniczych  
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów  
Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C  
02-222 Warszawa  
tel: +48 22 49 21 301  
faks: +48 22 49 21 309

strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Jakiegokolwiek podejrzenie wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego REBLOZYL można również zgłaszać telefonicznie pod numer +48 22 260 6404 lub drogą elektroniczną na adres: [informacja.medyczna@bms.com](mailto:informacja.medyczna@bms.com)

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących mechanizmu działania i działań niepożądanych należy zapoznać się z Ulotką dla Pacjenta produktu leczniczego REBLOZYL.

## Pacjentowi został przepisany lek REBLOZYL

### Ważne informacje kontaktowe

Lekarz, który przepisał lek REBLOZYL:

Nazwisko:

Numer telefonu w miejscu pracy:

Adres ośrodka:

