

# OPDIVO® (nivolumab)

---

## Patientkort

DK v10.0/Godkendt: Juli 2020

DK v10.0/Godkendt: Juli 2020

## Vigtige oplysninger til patienter

Sørg for altid at have kortet på dig, for at informere sundhedspersonale om at du modtager behandling med OPDIVO® eller OPDIVO® i kombination med YERVOY® (ipilimumab).

Fortæl det straks til lægen, hvis du får et eller flere tegn eller symptomer

### VIGTIGT

**OPDIVO®-behandling kan øge risikoen for alvorlige eller endog livstruende immunrelaterede bivirkninger, som kan påvirke forskellige dele af kroppen, f.eks.**

#### **Bryst (hjerter og lunger):**

- Vejrtrækningsbesvær, hoste, hvæsende vejrtrækning, brystsmerte, uregelmæssig hjerterytme, hjertebanken (øget opmærksomhed på din hjerterytme)

#### **Tarm og mave:**

- Diarré (vandig, løs eller blød afføring), blod eller slim i afføringen, mørkfarvet afføring, smerter eller ømhed i maven eller maveregionen

#### **Lever:**

- Gulfarvning af huden eller øjnene (gulsot), smerter i højre side af maven

#### **Nyrer:**

- Ændring i mængde og/eller frekvens af urin

#### **Hormonproducerende kirtler (herunder diabetes):**

- Hovedpine, sløret syn eller dobbeltsyn, træthed, vægtændringer, ændret adfærd (f.eks. mindre sexlyst, irriteret adfærd eller glemsomhed), overdreven tørst, øget appetit med vægttab, svækkelse, dødsighed, nedtrykthed, irriteret adfærd, utilpashed, ændring i mængde og/eller frekvens af urin

#### **Hud:**

- Hududslæt, kløe, blærer og/eller afskalning af huden (potentielt livsfarligt), sår, tør hud, små knuder på huden

#### **Andre:**

- Svækkelse, træthed, nedsat appetit, kvalme, opkastning, snurrende fornemmelse eller følelseløshed i arme og ben, problemer med at gå, feber, hævede lymfeknuder, hovedpine, anfald, stiv nakke, forvirring, dødsighed, muskelsmerter, stivhed, mørkfarvet urin, rødme eller smerter i øjnene, sløret syn eller andre problemer med synet

### VIGTIGT

- Fortæl din læge om tidligere medicinske tilstande, herunder hvis du har fået en stamcelletransplantation, der anvendte stamceller fra en donor (allogen transplantation)
- Tegn og symptomer, som kan virke milde, kan hurtigt forværres, hvis de ikke behandles
- Forsøg **ikke**, at behandle disse symptomer selv
- Tidlig vurdering og behandling af bivirkninger af din læge mindsker sandsynligheden for, at behandlingen med OPDIVO® eller OPDIVO® i kombination med YERVOY® skal udskydes eller helt stoppes
- Tegn og symptomer kan være forsinkede og kan opstå uger eller måneder efter din sidste dosis

For yderligere oplysninger, se venligst indlægssedlen for OPDIVO® i pakningen eller på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk) eller kontakt Medicinsk Information hos Bristol-Myers Squibb på telefon: 45280128 eller e-mail: [medinfo.denmark@bms.com](mailto:medinfo.denmark@bms.com)

## Min onkologs/hæmatologs kontaktoplysninger

(lægen der ordinerede OPDIVO® eller OPDIVO® i kombination med YERVOY®)

Lægens navn:

.....

Lægens telefonnummer:

.....

Telefonnummer uden for åbningstiden:

.....

## Mine kontaktoplysninger

Mit navn:

.....

Mit telefonnummer:

.....

Kontakt til nærmeste pårørende (i nødstilfælde)  
(navn og telefonnummer):

.....

**Sundhedspersonen, der behandler denne patient med OPDIVO® eller OPDIVO® i kombination med YERVOY®, skal udfylde afsnittet "Min læges kontaktoplysninger" i dette Patientkort.**



## VIGTIGE oplysninger til sundhedspersonale

- Denne patient er i behandling med OPDIVO® eller OPDIVO® i kombination med YERVOY®
- Immunrelaterede bivirkninger (irAR'er) kan opstå på et hvilket som helst tidspunkt under behandlingen eller måneder efter seponering af behandlingen
- Tidlig diagnose og korrekt behandling er vigtig for at minimere livstruende komplikationer
- Konsultation med en onkolog eller anden medicinsk specialist kan være nyttig til håndtering af organspecifikke irAR
- Sundhedspersonale kan indhente yderligere oplysninger fra produktresuméet for OPDIVO® på [www.ema.europa.eu](http://www.ema.europa.eu) eller kontakte Medicinsk Information hos Bristol-Myers Squibb på telefon: 45280128 eller e-mail: [medinfo.denmark@bms.com](mailto:medinfo.denmark@bms.com)

### For yderligere oplysninger,

For yderligere oplysninger, se produktresuméet for OPDIVO® på [www.ema.europa.eu](http://www.ema.europa.eu) eller ring til Medicinsk Information hos Bristol-Myers Squibb på telefon: 45280128 eller e-mail: [medinfo.denmark@bms.com](mailto:medinfo.denmark@bms.com).