

# PATIENTKORT

---

**(fødedygtige kvinder)**

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Yderligere oplysninger om indberetning af bivirkninger fremgår af indlægssedlen.

## Patientinformation

REBLOZYL® (Iuspaterecept) må ikke anvendes under graviditet og i 3 måneder inden du bliver gravid. REBLOZYL kan skade det ufødte barn.

Brug ikke REBLOZYL, hvis du er gravid eller ammer, eller hvis du kan blive gravid og ikke bruger mindst én meget sikker præventionsmetode.

### Inden behandling med REBLOZYL starter:

1. Skal du have en negativ graviditetstest, som er blevet bekræftet af din ordinerende læge.
  2. Du skal tale med din læge om sikre præventionsmetoder og bruge mindst én meget sikker præventionsmetode, mens du tager REBLOZYL og i mindst 3 måneder efter at behandlingen med REBLOZYL er ophørt.
- En graviditetstest skal gentages med passende intervaller, hvilket du aftaler med din læge.
  - Fortæl det straks til din læge, hvis du bliver gravid eller mener du kan være gravid. Dette gælder under behandling med REBLOZYL og i 3 måneder efter at behandlingen med REBLOZYL er ophørt.

Din ordinerende læges kontaktoplysninger står på bagsiden af dette patientkort.

Ønsker du mere information om virkninger og bivirkninger af REBLOZYL, kan du læse indlægssedlen for REBLOZYL. Den seneste version af indlægssedlen findes på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)

Yderligere oplysninger eller en kopi af patientkortet fås ved henvendelse til Bristol Myers Squibb på [medinfo.denmark@bms.com](mailto:medinfo.denmark@bms.com)  
Indlægssedlen er tilgængelig på – [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)

# Jeg har fået ordineret REBLOZYL®

## Vigtige kontaktoplysninger

Min læge, som har ordineret REBLOZYL:

Navn: .....

Konsultationens telefonnummer: .....

Konsultationens adresse: .....

.....

