

驗孕檢查



定期告知



避孕措施



# 具生育能力女性病人須知 樂普舒® (ZEPOSIA)



## 重要聯絡資訊


處方樂普舒給我的醫師：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_

辦公室電話：\_\_\_\_\_

醫院地址：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## 病人須知

若在懷孕期間使用 ZEPOSIA® (ozanimod)，可能會傷害胎兒，潛在風險包括失去胎兒及先天缺陷。

- 若您正在懷孕或在哺乳，或有懷孕的可能且沒有使用有效的避孕措施，請不要使用 ZEPOSIA。
- 開始 ZEPOSIA 治療前：



您的處方醫師將向您確認是否正在懷孕或哺乳，必要時將進行驗孕檢查。



您的處方醫師將向您解釋若您在服用 ZEPOSIA 期間懷孕對胎兒的潛在風險，並且定期告知您該如何將風險降至最低。



您必須在服用 ZEPOSIA 期間及終止 ZEPOSIA 治療後 3 個月使用有效的避孕措施。

- 如您在治療期間懷孕，則需停用 ZEPOSIA。您的醫師將會告知您與 ZEPOSIA 相關的對胎兒有害影響。
- 您須在計畫懷孕前 3 個月停止服用 ZEPOSIA。
- 如果您停止服用 ZEPOSIA，請立即告知醫師您的潰瘍性結腸炎是否惡化，因為這種疾病可能會復發。
- 若您正在懷孕或在哺乳，或認為您可能已經懷孕或計畫生育，請立刻告知您的醫師。

關於您的處方醫師聯絡資訊，請參閱此須知的背面。

關於更多 ZEPOSIA 的效果以及副作用的資訊，請參閱 ZEPOSIA 的藥品說明書。

若您欲瞭解更多資訊或須索取本文件的檔案，請查看台灣必治妥施貴實股份有限公司的網站 <https://www.bms.com/tw/product-information.html> 或致電 0800-666-132。

# A6\_具生育能力女性病人須知

## 封面



Bristol Myers Squibb™

驗孕檢查 定期告知 避孕措施

樂普舒® (ZEPOSIA)  
once-daily | ozanimod

ZEPOSIA  
once-daily | ozanimod

**重要聯絡資訊**

處方樂普舒給我的醫師： \_\_\_\_\_

姓名： \_\_\_\_\_

辦公室電話： \_\_\_\_\_

醫院地址： \_\_\_\_\_

Bristol Myers Squibb™ 2084-TW-2300042 / TFDA核准日期：2023年5月19日




## 內頁



### 病人須知

若在懷孕期間使用 ZEPOSIA® (ozanimod)，可能會傷害胎兒，潛在風險包括失去胎兒及先天缺陷。

- 若您正在懷孕或在哺乳，或有懷孕的可能且沒有使用有效的避孕措施，請不要使用 ZEPOSIA。
- 開始 ZEPOSIA 治療前：

		
您的處方醫師將向您確認是否正在懷孕或哺乳，必要時將進行驗孕檢查。	您的處方醫師將向您解釋若您在服用 ZEPOSIA 期間懷孕對胎兒的潛在風險，並且定期告知您該如何將風險降至最低。	您必須在服用 ZEPOSIA 期間及終止 ZEPOSIA 治療後 3 個月使用有效的避孕措施。

- 如您在治療期間懷孕，則需停用 ZEPOSIA。您的醫師將會告知您與 ZEPOSIA 相關的對胎兒有害影響。
- 您須在計畫懷孕前 3 個月停止服用 ZEPOSIA。
- 如果您停止服用 ZEPOSIA，請立即告知醫師您的潰瘍性結腸炎是否惡化，因為這種疾病可能會復發。
- 若您正在懷孕或在哺乳，或認為您可能已經懷孕或計畫生育，請立刻告知您的醫師。

關於您的處方醫師聯絡資訊，請參閱此須知的背面。

關於更多 ZEPOSIA 的效果以及副作用的資訊，請參閱 ZEPOSIA 的藥品說明書。

若您欲瞭解更多資訊或須索取本文件的檔案，請查看台灣必治妥施貴寶股份有限公司的網站 <https://www.bms.com/tw/product-information.html> 或致電 0800-666-132。