

- Informieren Sie sofort Ihren Arzt oder Ihre Ärztin, falls Sie während der Einnahme von ZEPOSIA® schwanger werden. Ihr Arzt oder Ihre Ärztin wird entscheiden, die Behandlung mit ZEPOSIA® abzubrechen, gleichzeitig erfolgt eine spezialisierte Überwachung des ungeborenen Kindes.
- 3 Monate bevor Sie eine Schwangerschaft planen, müssen Sie ZEPOSIA® absetzen.
- Wenn Sie ZEPOSIA® absetzen, informieren Sie sofort Ihren Arzt oder Ärztin, wenn sich die Symptome der Krankheit verschlechtern. Es besteht die Möglichkeit, dass die Krankheit wieder aktiv wird.

- Informieren Sie **sofort** Ihren Arzt oder Ihre Ärztin, wenn Sie schwanger sind oder stillen oder wenn Sie glauben, dass Sie schwanger sein könnten oder planen, schwanger zu werden. Die Kontaktdaten Ihres behandelnden Arztes befinden sich auf der Rückseite dieser Patientenkarte.

Für zusätzliche Informationen zu Wirkungen und Nebenwirkungen von ZEPOSIA® lesen Sie bitte die Patienteninformation (Packungsbeilage).

**Bristol Myers Squibb SA, 07/2024, ZEPOSIA® (Ozanimod),
Patienten-Erinnerungskarte zur Schwangerschaft.
PromoMats approval number: 2084-CH-2400038.**

**ZEPOSIA®
(Ozanimod)**

PATIENTEN-ERINNERUNGSKARTE ZUR SCHWANGERSCHAFT

Informationen für Patientinnen, die Schwanger werden könnten.

- ▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit.

 **Bristol Myers Squibb™**

Mir wurde ZEPOSIA® verschrieben.

Wichtige Kontaktinformationen

Der Arzt/Die Ärztin, der/die mir ZEPOSIA® verschrieben hat:

Name:

Telefon:

Adresse:

Informationen für Patientinnen

ZEPOSIA® kann das ungeborene Kind schädigen, wenn ZEPOSIA® während der Schwangerschaft eingenommen wird. Mögliche Risiken schliessen den Verlust des ungeborenen Kindes und Fehlbildungen ein.

- Sie dürfen ZEPOSIA® nicht einnehmen, wenn Sie schwanger sind oder wenn Sie schwanger werden können und keine wirksame Empfängnisverhütung anwenden. Falls Sie stillen, muss mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin eine Entscheidung getroffen werden, ob das Stillen zu unterbrechen ist oder ob auf die Behandlung mit ZEPOSIA® verzichtet werden soll.

- Bevor Sie die Behandlung mit ZEPOSIA® beginnen:
 1. Wird Sie Ihr behandelnder Arzt oder Ihre Ärztin über die möglichen Risiken für das ungeborene Kind informieren, die bestehen, wenn Sie während der Einnahme von ZEPOSIA® schwanger werden, und Sie regelmässig informieren, wie Sie die Risiken verringern können.
 2. Müssen Sie sicherstellen, dass Sie während der Behandlung mit ZEPOSIA® und für 3 Monate nach Absetzen von ZEPOSIA® eine wirksame Empfängnisverhütung anwenden.
 3. Müssen Sie einen negativen Schwangerschaftstest vorweisen, der von Ihrem verschreibenden Arzt oder Ihrer Ärztin überprüft wird.