

IPILIMUMAB

Bristol Myers Squibb

Tarjeta de alerta del paciente

Número de aprobación local: *ONC-CL-230038*



Información importante para los pacientes

Lleve consigo esta tarjeta en todo momento para informar a los profesionales de la salud de que está recibiendo tratamiento con IPILIMUMAB en monoterapia.



Si tiene algún signo o síntoma, informe a su médico inmediatamente.

POSIBLES EVENTOS ADVERSOS



INTESTINO Y ESTÓMAGO

- diarrea (heces acuosas, sueltas o blandas), heces sanguinolentas u oscuras
- deposiciones más frecuentes de lo habitual
- dolor o sensibilidad en la zona del estómago o abdomen, náuseas, vómitos



OJOS

- enrojecimiento del ojo
- dolor en el ojo
- problemas de visión o visión borrosa



HÍGADO

- coloración amarillenta de los ojos o la piel (ictericia)
- dolor en el lado derecho de la zona del estómago
- orina oscura



NERVIOS

- debilidad muscular
- entumecimiento u hormigueo en piernas, brazos o cara
- mareos, pérdida del conocimiento o dificultad para levantarse o desmayos.



PIEL

- erupción cutánea con o sin picazón, piel seca
- ampollas y/o descamación de la piel, llagas en la boca
- hinchazón en la cara o en los ganglios linfáticos.



GENERAL

- fiebre, dolor de cabeza, cansancio
- sangrado
- cambios de comportamiento (p. ej., deseo sexual disminuido, irritabilidad u olvidos) deshidratación, presión arterial baja.



IMPORTANTE

- Informe a su médico de cualquier afección médica previa, incluido si se ha sometido a un trasplante de células madre que utiliza células madre de donante (allogénicas).
- El tratamiento temprano de los efectos secundarios reduce la probabilidad de que el tratamiento con IPILIMUMAB deba interrumpirse de forma temporal o permanente.
- Los signos y síntomas que pueden parecer leves pueden empeorar rápidamente si no se tratan.
- NO intente tratar estos síntomas usted mismo.
- Los signos y síntomas pueden retrasarse y pueden producirse semanas o meses después de su última administración de IPILIMUMAB.

Información de contacto de mi médico (*quien prescribió IPILIMUMAB*)

Nombre del médico:

Teléfono de la consulta:

Teléfono fuera del horario laboral:

Mi información de contacto

Mi nombre y teléfono:

Nombre y teléfono del cuidador (en caso de emergencia):



Información **IMPORTANTE** para profesionales de la salud

- Este paciente es tratado con **IPILIMUMAB** en monoterapia.
- Pueden aparecer reacciones adversas relacionadas con el sistema inmune (irARs, por sus siglas en inglés) en cualquier momento durante el tratamiento o meses después de su interrupción.
- El diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado son esenciales para minimizar las complicaciones que ponen en riesgo la vida.
- La consulta con un oncólogo u otro especialista médico puede ser útil para el tratamiento de las reacciones adversas inmunomediadas órgano- específica.
- Los profesionales de la salud deben consultar el Folleto de Información profesional de IPILIMUMAB o contactar a Información médica de Bristol Myers Squibb de Chile al [1230 020 5542](tel:12300205542) o al correo infomedicalatam@bms.com para obtener más información.



El profesional de la salud que trata a este paciente con IPILIMUMAB debe completar la sección “Información de contacto de **mi médico**” de esta tarjeta de alerta del paciente.