

NIVOLUMAB

Bristol Myers Squibb

Tarjeta de alerta del paciente

Número de aprobación local: ONC-CL-2300028



Información importante para los pacientes

Lleve con usted esta tarjeta en todo momento para informar a los profesionales de la salud de que está recibiendo tratamiento con NIVOLUMAB o NIVOLUMAB en combinación con IPILIMUMAB.



Si tiene algún signo o síntoma, informe a su médico inmediatamente.

IMPORTANTE

- ❖ El tratamiento con NIVOLUMAB puede aumentar el riesgo de efectos secundarios inmunitarios graves o incluso potencialmente mortales, que pueden afectar a diferentes partes del cuerpo. Los signos y síntomas a los que hay que prestar atención incluyen los siguientes, aunque no son los únicos:
 - **General:** cambios de humor o conducta (p. ej., disminución del deseo sexual, irritabilidad, olvidos), confusión, sensación de malestar, fiebre, dolores de cabeza, aumento o disminución del apetito, náuseas o vómitos, convulsiones (ataques), inflamación de ganglios linfáticos, sed excesiva, cansancio, pérdida o aumento de peso, hormigueo y/o entumecimiento.
 - **Ojos:** cambios en la visión (p. ej., visión borrosa, otros problemas de visión), enrojecimiento o dolor ocular, coloración amarillenta de la parte blanca de los ojos
 - **Piel:** sequedad de la piel, picazón, erupción cutánea, formación de ampollas/descamación o color amarillento (ictericia), bultos/protuberancias en la piel, reacciones cutáneas graves
 - **Músculos y huesos:** dolores musculares o articulares, debilidad muscular, rigidez de cuello.
 - **Boca, nariz y garganta:** úlceras en la boca u otras membranas mucosas (p. ej., nariz, párpados)
 - **Tórax:** dolor en el pecho, dificultades para respirar, tos, latidos cardíacos irregulares, palpitaciones (los latidos cardíacos se perciben más de lo normal)

- **Estómago e intestino (intestino):** heces oscuras, alquitranadas o pegajosas, sangre o mucosidad en las heces, diarrea, dolor o malestar en el estómago o la zona abdominal
- **Riñones y vejiga:** disminución o aumento de la cantidad de orina, orina de color más oscuro de lo normal.

IMPORTANTE

- ❖ Informe a su médico de cualquier condición médica previa, incluido si se ha sometido a un trasplante de células madre que utiliza células madre de donante (alogénicas).
- ❖ La evaluación temprana y el tratamiento de los efectos secundarios por parte de su médico reducen la probabilidad de que el tratamiento con NIVOLUMAB o NIVOLUMAB en combinación con IPILIMUMAB deba interrumpirse de forma temporal o permanente.
- ❖ Los signos y síntomas que pueden parecer leves pueden empeorar rápidamente si no se tratan.
- ❖ NO intente tratar estos síntomas usted mismo.
- ❖ Los signos y síntomas pueden retrasarse y pueden producirse semanas o meses después de su última inyección.

Para obtener más información, lea el folleto de información al paciente de *NIVOLUMAB* o llame a Información médica de Bristol Myers Squibb de Chile al número *1230 020 5542* o escriba al correo infomedicalatam@bms.com para obtener más información.

Información de contacto de mi médico

(quien prescribió NIVOLUMAB o NIVOLUMAB en combinación con IPILIMUMAB)

Nombre del médico:

Teléfono de la consulta:

Un teléfono para llamadas fuera de horario laboral:

Mi información de contacto


Mi nombre y teléfono:

Contacto de emergencia (nombre y teléfono):

Información IMPORTANTE para profesionales de la salud

- Este paciente se trata con **NIVOLUMAB** o **NIVOLUMAB en combinación con IPILIMUMAB**.
- Pueden aparecer reacciones adversas relacionadas con el sistema inmunitario (irAR) en cualquier momento durante el tratamiento o meses después de la interrupción del tratamiento.
- El diagnóstico temprano y el manejo adecuado son fundamentales para minimizar las complicaciones que representan un riesgo para la vida.
- La consulta con un oncólogo u otro especialista médico puede ser útil para el tratamiento de las irAR órgano-específicas.

Los profesionales de la salud deben consultar el Folleto de información al profesional de NIVOLUMAB o contactar a Información médica de Bristol Myers Squibb de Chile al *1230 020 5542* o al correo infomedicalatam@bms.com para obtener más información.

 El profesional de la salud que trata a este paciente con NIVOLUMAB o NIVOLUMAB en combinación con IPILIMUMAB debe completar la sección “Información de contacto de mi médico” de esta tarjeta de alerta del paciente.