

# Patientenausweis



**DE**

**Eliquis®**

**(Apixaban)**

**Tragen Sie diesen Ausweis  
ständig bei sich**

**Zeigen Sie diesen Ausweis Ihrem Apotheker,  
Ihrem Zahnarzt und allen Ärzten, die Sie behandeln.**

## Information für Patienten

- Nehmen Sie Eliquis regelmäßig nach den Anweisungen Ihres Arztes ein. Wenn Sie eine morgendliche Einnahme vergessen haben, nehmen Sie die Tablette, sobald Sie es bemerken; die Einnahme kann zusammen mit der Abenddosis erfolgen. Eine vergessene Abenddosis darf nur am selben Abend eingenommen werden. Nehmen Sie am nächsten Morgen nicht zwei Dosen ein; setzen Sie stattdessen die Einnahme wie gewohnt zweimal täglich wie empfohlen am nächsten Tag fort.
- Brechen Sie die Behandlung mit Eliquis nicht ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem Arzt ab, da bei Ihnen das Risiko eines Schlaganfalls oder anderer Komplikationen besteht.

- Eliquis hilft, Ihr Blut zu verdünnen. Dies kann jedoch das Risiko für Blutungen erhöhen.
- Anzeichen und Symptome von Blutungen können Blutergüsse oder Einblutungen unter der Haut, Teerstuhl, Blut im Urin, Nasenbluten, Schwindel, Müdigkeit, Blässe, Schwäche, plötzliche starke Kopfschmerzen, Abhusten von Blut oder blutiges Erbrechen sein.
- Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, falls bei Ihnen eine Blutung nicht selbstständig aufhört.
- Falls bei Ihnen eine Operation oder ein invasiver Eingriff notwendig sein sollte, informieren Sie vor der Operation Ihren behandelnden Arzt, dass Sie Eliquis einnehmen.

Juli 2024



## Waarschuwingiskaart voor de patiënt

**NL**

**Eliquis®**

**(apixaban)**

**Het is belangrijk dat u deze kaart altijd bij u draagt**

**Laat deze kaart zien aan uw apotheker,  
uw tandarts en alle andere medische zorgverleners waar u onder behandeling bent.**

## Informatie voor patiënten

- Gebruik Eliquis altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Als u een dosis in de ochtend heeft gemist, neem deze dan zodra u eraan denkt. Deze dosis kan tegelijk met de avonddosis worden ingenomen. Een gemiste avonddosis mag alleen nog dezelfde avond worden ingenomen. Neem niet de volgende ochtend twee doses, maar houdt u daarna weer aan uw gebruikelijke doseerschema van tweemaal daags zoals aanbevolen.
- Stop niet met het innemen van Eliquis zonder overleg met uw arts, omdat u risico loopt op een beroerte of andere problemen als gevolg van het ontstaan van een bloedstolsel.
- Eliquis helpt uw bloed dunner te maken. Dit kan echter zorgen voor een verhoging van het risico op bloedingen.

- Klachten en verschijnselen van bloedingen kunnen bijvoorbeeld zijn: blauwe plekken of bloedingen onder de huid, donkergekleurde ontlasting (bloed in de ontlasting), bloed in de urine, bloedneus, duizeligheid, vermoeidheid, bleek zien, zwakte, plotselinge ernstige hoofdpijn, ophoesten van bloed of braken van bloed.
- Als u last heeft van bloedingen die niet vanzelf stoppen, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- Als u een operatie of een invasieve procedure moet ondergaan, vertel uw behandelend arts dan dat u Eliquis gebruikt.

juli 2024



## Carte de surveillance du patient

**FR**

**Eliquis®**

**(apixaban)**

**Portez cette carte sur vous en permanence**

**Présentez cette carte à votre pharmacien,  
votre dentiste et tout autre professionnel de santé qui vous traite.**

## Information destinée aux patients

- Prendre Eliquis à heures fixes, comme indiqué. Si vous oubliez une dose le matin, prenez-la dès que vous vous en apercevez. Elle peut être prise en même temps que la dose du soir. Une dose oubliée le soir ne peut être prise qu'au cours de la même soirée. Ne prenez pas deux doses le lendemain matin, mais au contraire continuez le lendemain à prendre votre traitement selon le schéma habituel deux fois par jour conformément à la prescription.
- N'arrêtez pas le traitement par Eliquis sans en avoir parlé à votre médecin car vous risquez de faire un accident vasculaire cérébral ou de subir d'autres complications.
- Eliquis aide à fluidifier votre sang. Cependant, cela peut augmenter votre risque de saignement.

- Les signes et les symptômes de saignement incluent des ecchymoses ou des saignements sous la peau, des selles noires, du sang dans les urines, des saignements du nez, des sensations vertigineuses, de la fatigue, pâleur ou faiblesse, maux de têtes intenses et soudains, crachat de sang ou vomissement de sang.
- Si le saignement ne s'arrête pas de lui-même, demandez immédiatement un avis médical.
- En cas de chirurgie ou d'une quelconque procédure invasive, informez votre médecin que vous prenez Eliquis.

Juillet 2024

## Ich werde mit dem Antikoagulans Eliquis (Apixaban) behandelt, um der Entstehung von Blutgerinnseln vorzubeugen.

### Information für Arzt und Apotheker

- Eliquis (Apixaban) ist ein orales Antikoagulans, das durch die direkte, selektive Hemmung des Blutgerinnungsfaktors Xa wirkt.
- Eliquis kann das Risiko für Blutungen erhöhen. Im Falle einer schweren Blutung ist die Behandlung mit Eliquis unverzüglich abzubrechen.
- Die Behandlung mit Eliquis erfordert keine Routineüberwachung der Exposition. Ein kalibrierter quantitativer anti-Faktor Xa Test kann in Ausnahmesituationen, z.B. bei Überdosierungen und Notfalloperationen, nützlich sein (Prothrombinzeit (PT), International Normalized Ratio (INR) und aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT) Gerinnungstests sind nicht empfohlen) - siehe Fachinformation.
- Ein Arzneimittel zur Aufhebung der Anti-FXa-Aktivität von Apixaban steht zur Verfügung.

Bitte füllen Sie diesen Abschnitt aus oder bitten Sie Ihren Arzt darum

Name: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Indikation: \_\_\_\_\_

Dosierung: \_\_\_\_\_ mg 2x täglich

Name des Arztes: \_\_\_\_\_

Telefonnummer des Arztes: \_\_\_\_\_



## Ik ben onder behandeling voor antistolling middels Eliquis (apixaban) ter preventie van bloedstolsels

### Informatie voor beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

- Eliquis (apixaban) is een orale anticoagulant die werkt door directe selectieve remming van factor-Xa.
- Eliquis kan het risico op bloedingen verhogen. In geval van ernstige bloedingen moet de behandeling met Eliquis direct gestaakt worden.
- Bij de behandeling met Eliquis is routinematische monitoring van de blootstelling niet noodzakelijk. Een gekalibreerde kwantitatieve anti-factor-Xa-assay kan in uitzonderlijke situaties nuttig zijn, zoals in geval van overdosis en noodchirurgie (protrombinetijd (PT) internationale genormaliseerde ratio (INR) en een geactiveerde partiële tromboplastinetijd (PTT) stollingstest worden niet aanbevolen) zie de Samenvatting van Productkenmerken.
- Een middel om de anti-factor-Xa-activiteit van apixaban om te keren is beschikbaar.

Gelieve dit gedeelte in te vullen of vraag uw arts dit te doen

Naam: \_\_\_\_\_

Geboortedatum: \_\_\_\_\_

Indicatie: \_\_\_\_\_

Dosering: \_\_\_\_\_ mg tweemaal daags

Naam van de arts: \_\_\_\_\_

Telefoonnummer van de arts: \_\_\_\_\_



## Je suis sous traitement anticoagulant avec Eliquis (apixaban) pour prévenir la formation de caillots sanguins.

### Information destinée aux professionnels de santé

- Eliquis (apixaban) est un anticoagulant oral agissant par inhibition directe et sélective du facteur Xa.
- Eliquis peut augmenter le risque de saignement. En cas d'événements hémorragiques majeurs, il doit être arrêté immédiatement.
- Le traitement par Eliquis ne nécessite pas de surveillance de routine de l'exposition. Un test quantitatif calibré anti-Facteur Xa peut être utile dans des situations exceptionnelles, par exemple en cas de surdosage ou d'intervention chirurgicale d'urgence (les résultats des paramètres de la coagulation, temps de prothrombine (TP), rapport normalisé international (INR) et temps de céphaline activé (TCA) ne sont pas recommandés) - voir le RCP.
- Un agent permettant d'inverser l'activité de l'anti-Facteur Xa d'apixaban est disponible.

Veuillez compléter cette rubrique ou demander à votre médecin de le faire

Nom : \_\_\_\_\_

Date de naissance : \_\_\_\_\_

Indication : \_\_\_\_\_

Dose : \_\_\_\_\_ mg deux fois par jour

Nom du médecin : \_\_\_\_\_

N° de téléphone du médecin : \_\_\_\_\_